



# Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

## Шкалы оценки состояния пациента

### Wells для клинического прогноза тромбоза глубоких вен

По 1 баллу за:

- Активный злокачественный процесс (во время или через 6 мес после лечения)
- Паралич, парез или гипсовая иммобилизация нижних конечностей
- Постельный режим >3 дней или большие хирургические вмешательства в течение последних 12 нед
- Локализованная боль или чувствительность по ходу глубоких вен нижних конечностей
- Отек нижней конечности
- Отек голени (окружность на 3 см больше интактной конечности, измеряемая на уровне 10 см ниже мыщелка большеберцовой кости)
- Отек конечности с образованием ямки при надавливании (меньше на интактной ноге)
- Коллатеральные поверхностные вены (не варикозные)
- Эпизоды ТГВ в анамнезе

Минус 2 балла при:

- Альтернативный диагноз не менее вероятен, чем ТГВ

**Результат:** вероятность ТГВ: низкая – 0 баллов; средняя – 1-2 балла; высокая – 3 балла и более.

### Wells для клинического прогноза возникновения ТЭЛА

- Наличие ТЭЛА или ТГВ в анамнезе +1,5 балла
- ЧСС более 100 в минуту +1,5 балла
- Операция или иммобилизация +1,5 балла
- Клинические признаки ТГВ +3 балла
- Диагноз, альтернативный ТЭЛА +3 балла
- Кровохарканье +1 балл
- Рак +1 балл

Оценка результата: клинический риск ТЭЛА:

- низкий 0-1 балл
- умеренный 2-6 баллов
- высокий более 7 баллов

