



Хабаровское краевое научно-практическое  
общество анестезиологов и реаниматологов

## ATLS классификация Американской Коллегии Хирургов оценки кровопотери при первичной оценке пациента

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Объем</b>	<b>&lt; 750 (&lt;15)</b>	<b>750-1500 (15-30)</b>	<b>1500-2000 (30-40)</b>	<b>&gt;2000 (&gt;40)</b>
<b>ЧСС, в мин</b>	<b>&lt;100</b>	<b>&gt;100</b>	<b>&gt;120</b>	<b>&gt;140</b>
<b>АД</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>↓</b>	<b>↓↓</b>
<b>ПД</b>	<b>N или ↑</b>	<b>↓</b>	<b>↓</b>	<b>↓↓</b>
<b>Диурез мл/час</b>	<b>&gt; 30</b>	<b>20-30</b>	<b>5-15</b>	<b>Анурия</b>
<b>Сознание</b>	<b>Легкое возбуждение</b>	<b>Возбуждение</b>	<b>Спутанное</b>	<b>Прекома</b>
<b>ЧСС</b>	<b>N</b>	<b>20-30</b>	<b>30-40</b>	<b>&gt;35</b>
<b>Тест заполнения капилляров</b>	<b>Норма</b>	<b>Замедленный</b>	<b>Очень замедленный</b>	<b>Заполнение отсутствует</b>

