



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Шкала оценки полиорганной недостаточности Bakker J. и соавт.
у пациентов с септическим шоком
Organ Failure Score of Bakker J. et al. for Patients in Septic Shock
(Bakker J. et al., 1996)

Показатель	Характеристика	Оценка
Искусственная вентиляция легких	≤ 24 ч	0
	> 24 ч	1
PaO_2/FiO_2	≥ 250 мм рт. ст.	0
	< 250 мм рт. ст.	1
Функция почек (исходно нормальная)	Концентрация продуктов азотистого обмена в крови < 40 мг/дл и креатинина ≤ 180 мкмоль/л	0
	Концентрация продуктов азотистого обмена в крови > 80 мг/дл и креатинина > 350 мкмоль/л	2
	Другие признаки поражения почек	1
Функция почек (исходно изменена)	Изменение концентрации продуктов азотистого обмена и креатинина менее чем в 1,5 раза от исходных значений	0
	Изменение концентрации продуктов азотистого обмена и креатинина в пределах 1,5-1,99 от исходных значений	1
	Изменение концентрации продуктов азотистого обмена и креатинина более чем в 2 раза от исходных значений	2
Концентрация общего билирубина при отсутствии гемолиза	≤ 34 мкмоль/л	0
	> 34 мкмоль/л	1
AST и ALT	АСТ и АЛТ ≤ 80 МЕ/л	0
	АСТ или АЛТ > 80 МЕ/л	1
Количество тромбоцитов	≥ 100000 /л	0
	> 100000 /л	1
ПВ и АПТВ	ПВ $\geq 60\%$ и АПТВ ≤ 80 с	0
	ПВ $< 60\%$ или АПТВ > 80 с	1

Общая оценка по шкале = Сумма всех баллов

Интерпретация:

Минимальная оценка: 0 баллов

Максимальная оценка: 8 баллов

Чем выше оценка по шкале, тем тяжелее степень полиорганной недостаточностью.

