



## Оценка риска периоперационных ТЭО, модель Caprini

1 балл	2 балла	3 балла	5 баллов
Малая операция Возраст 41-60 л ИМТ > 25кг/м2 Отекшие ноги Варикозные вены Беременность или п/родовый период КОК или ЗГТ Сепсис Тяжелая легочная патология, включая пневмонию Нарушение функции легких ОИМ ЗСН Воспалительные заболевания кишечника в анамнезе Постельный режим	Возраст 61-74 Артроскопические операции Полостные операции более 45 минут Лапароскопии более 45 минут Злокачественный процесс Пребывание в постели более 72 часов Гипсовые повязки Центральные венозные катетеры	Возраст > 74лет ВТЭ в анамнезе Лейденская мутация Мутация протромбина 20210А ВА Антикардиолипиновые антитела ГГЦ ГИТ Другие врожденные и приобретенные тромбофилии	Инсульт (до 1 мес) Плановая артропластика Переломы таза, бедра, голени Травма позвоночника (до 1 мес)

- 0-1 балл – очень низкий риск
- 2 балла – низкий риск
- 3-4 баллов – умеренный риск
- 5 и более баллов – высокий риск

**Prevention of VTE in Nonsurgical Patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines, 2012**

