



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Прогностический индекс менингококковой септицемии Глазго Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score (GMSPS)

Показатель	Значение	Баллы
Систолическое АД	< 75 мм рт.ст. при возрасте < 4 лет; <85 мм рт.ст., если ≥ 4 года	3
	≥ 75 мм рт.ст. при возрасте < 4 лет ≥ 85 мм рт. ст., если ≥ 4 годам	0
Кожная к ректальной температурная разница	$>3^{\circ}\text{C}$	3
	$\leq 3^{\circ}\text{C}$	0
Модифицированная шкала оценки комы	<8 или ухудшение ≥ 3 баллам за час	3
	\geq и ухудшение < 3 баллов	0
Ухудшение за час перед оценкой	Есть	2
	Нет (стабилен за час до оценки)	0
Отсутствие менингизма	Есть	2
	Нет (стабилен за час до оценки)	0
Сыпь	Восходящая пурпура или распространенные экхимозы	1
Дефицит оснований (капиллярный или артериальный)	>8	1
	≤ 8	0

Прогностическая шкала менингококковой септицемии Glasgow =
Сумма оценок по семи параметрам.





Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Модифицированная шкала комы

Показатель	Значение	Баллы
Открытие глаз	Спонтанное	4
	На голос	3
	На боль	2
	Отсутствует	1
Лучшая вербальная реакция	Полностью ориентируется	6
	Слова	4
	Звуки	3
	Плач	2
	Отсутствует	1
Лучшая моторная реакция	Выполняет команды	6
	Локализует боль	4
	Двигается на болевой стимул	1
	Отсутствует	0

Модифицированная шкала комы = (Баллы за открытие глаз) + (Баллы за лучшую вербальную реакцию) + (Баллы за лучшую моторную реакцию)

Интерпретация:

Минимальный GMSPS-показатель: 0.

Максимальный GMSPS –показатель :15.

NB! Для прогнозирования вероятности летального исхода оценка должна проводиться при поступлении или в процессе госпитализации.

Конечный балл для летального исхода	Чувствительность, %	Специфичность, %	Положительный показатель угадывания, %	Отрицательный показатель угадывания, %
≥8	100	95	74	100
≥9	100	95	74	100
≥10	100	98	88	100

