



GUSTO

Global Utilization of Streptokinase and Tissue plasminogen activator to treat Occluded arteries-1

Шкала GUSTO предлагает использовать для оценки 30-дневного прогноза при ОКС наряду с возрастом, определенными данными сердечно-сосудистого анамнеза (наличие сердечной недостаточности, перенесенного инсульта или ИМ) дополнительные прогностические факторы, такие как повышение ЧСС, показателей кардиальных биомаркеров, креатинина, С-реактивного белка, а также факта наличия анемии.

Факторы риска		Баллы
Возраст 50 – 59 лет		2
Возраст 60 – 69 лет		4
Возраст 70 – 79 лет		6
Возраст 80 лет и старше		8
Сердечная недостаточность		2
Инсульты, преходящая ишемия мозга		2
ИМ, реваскуляризация или стабильная стенокардия		1
ЧСС >90 в минуту		3
Повышение тропонина или МВ КФК		3
Креатинин >1,4 мг%		2
СРБ >20 мг/л		2
СРБ 10 – 20 мг/л		1
Анемия		1
Сумма баллов	Риск, %	Событие, срок наступления
0-5	0,4	Вероятность летального исхода за 30 суток
6-10	2,8	
11-15	8,7	
16-19	25,0	
20-22	41,7	

