



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Шкала NEOMOD Neonatal Multiple Organ Dysfunction Score (Janota J. et al., 2001)

Система органов	Характеристика	Оценка
Центральна нервная система	Кровоизлияние в вещество головного мозга, развитие гидроцефалии, лейкомаляция или атрофия	2
	Кровоизлияние в один или оба боковых желудочка	1
	Только субэпендимальное кровоизлияние	0
Система гемостаза	Количество тромбоцитов менее $30 \times 10^9/\text{л}$	2
	Количество тромбоцитов равно $30-100 \times 10^9/\text{л}$	1
	Количество тромбоцитов более $100 \times 10^9/\text{л}$	0
Дыхательная система	Искусственная вентиляция легких	2
	Необходимо поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях или FiO_2 более 0,21 (для поддержания сатурации 88-95%)	1
	Самостоятельное дыхание без респираторной поддержки	0
Желудочно-кишечный тракт	Признаки некротически-язвенного энтероколита или перфорации кишки	2
	Полное парентеральное питание	1
	Энтеральное кормление или сочетание энтерального и парентерального питания	0
Сердечно-сосудистая система	Сохраняющаяся артериальная гипотензия, несмотря на проводимую медикаментозную терапию	2
	Нормализация артериального давления на фоне инотропной поддержки	1
	Показатели артериального давления в пределах нормальных значений	0
Мочевыделительная система	Диурез менее 0,2 мл/кг/ч, перитонеальный диализ, гемодиализ или гемосорбция	2
	Диурез 0,2-1,0 мл/кг/ч	1
	Диурез более 1,0 мл/кг/ч	0
Кислотно-основное состояние	Дефицит оснований более 15 мэкв/л	2
	Дефицит оснований в пределах 15 мэкв/л	1
	Дефицит оснований менее 15 мэкв/л	0

Шкала позволяет оценить состояние 7 систем, при отсутствии нарушений со стороны одной системы органов присваивается - 0 баллов, при умеренной дисфункции - 1 балл, при выраженной дисфункции - 2 балла.

