



Хабаровское краевое научно-практическое
общество анестезиологов и реаниматологов

Оценка риска ВТЭО после родов, RCOG, 2009

Степень риска	Факторы	Тактика
Высокий	Любой предыдущий ВТЭО Применение НМГ во время беременности	Обязательна тромбопрофилактика НМГ не менее 6 недель Эластическая компрессия
Умеренный	Кесарево сечение в родах Ожирение ВМІ > 40 кг/м ² Длительная госпитализация Тромбофилия без ВТЭО Экстрагенитальная патология: болезни сердца или заболевание легких, СКВ, воспалительные заболевания, нефротический синдром, серповидно-клеточная анемия.	Тромбопрофилактика НМГ в течение 7 суток Эластическая компрессия
Низкий	<ul style="list-style-type: none">• Возраст > 35 лет• Тучность (ВМІ > 30 кг/м²)• Паритет ≥ 3 • Варикозная болезнь вен• Курение• Длительная иммобилизация, например, параплегия, SPD• Преэклампсия• Длительные роды более 24 ч• Щипцы, ВЭ• Любые хирургические операции и послеродов• Послеродовое кровотечение более 1000 мл и гемотрансфузия	2 и более фактора: Умеренный риск Тромбопрофилактика НМГ в течение 7 суток Эластическая компрессия Меньше 2-х: Низкий риск Мобилизация и предупреждение дегидратации Эластическая компрессия

