



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Шкала седации и возбуждения Рикера Riker Sedation-Agitation Scale (SAS)

Оценка по SAS варьирует в диапазоне от 1 (без сознания) до 7 (крайне опасное возбуждение)

Уровень возбуждения или седации	Поведение	Баллы
Отсутствие возможности разбудить	Глубокий сон, без пробуждения, отсутствие спонтанных движений и кашля	4
Глубокая седация	Пробуждение в ответ на сильные тактильные стимуляции, периодически спонтанные и непроизвольные движения, отсутствие реакции на команды .	3
Седация	Сон/седация , пробуждение в ответ на тактильные стимулы, но быстро засыпает, реагирует на простые команды	2
Спокоен и контактен	Спокоен, легко пробуждается, выполняет словесные команды	1





Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Возбуждение	Беспокойство или умеренное возбуждение, попытки приподняться в постели, успокаивается в ответ на просьбы	5
Выраженное (сильное) возбуждение	Не успокаивается, несмотря на частые напоминания: требует физической иммобилизации, кусает интубационную трубку	6
Крайне опасное возбуждение	Резкое возбуждение, обильное потоотделение, частые энергичные движения, выталкивание эндотрахеальной трубки, попытки удалить катетеры, приподнимается над поручнями кровати, дерется с персоналом, мечется из стороны в сторону	7

