



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

SOFA (Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score – оценочная шкала последовательной [связанной с сепсисом] органной недостаточности)

Система	Баллы				
	0	1	2	3	4
Дыхание					
PaO ₂ /FiO ₂ мм рт ст (kPa)	≥400 (53,3)	<400 (53,3)	<300 (40)	<200 (26,7) с респираторной поддержкой	<100 (13,3) с респираторной поддержкой
Коагуляция					
Тромбоциты × 10 ³ /мкл	≥150	<150	<100	< 50	< 20
Функция печени					
билирубин мг/дл (мкмоль/л)	<1,2 (20)	1,2-1,9 (20-32)	2,0-5,9 (33-101)	6,0-11,9 (102-204)	>12,0 (204)
Сердечно-сосудистая система					
АД, вазопрессоры и инотропы	САД ≥ 70 мм рт ст	САД < 70 мм рт ст	Дофамин < 5 мкг/кг/мин, или добутамин в любой дозе	Дофамин – 5 – 15 мкг/кг/мин, или адреналин ≤ 0,1 мкг/кг/мин или норадреналин ≤ 0,1 мкг/кг/мин	Дофамин > 15 мкг/кг/мин, или адреналин > 0,1 мкг/кг/мин или норадреналин > 0,1 мкг/кг/мин
Центральная нервная система					
Шкала ком Глазго	15	13 - 14	10 - 12	6 - 9	< 6
Почки					
Креатинин мг/дл (мкмоль/л)	<1,2 (110)	1,2-1,9 (110-170)	2,0-3,4 (171-299)	3,5-4,9 (300-440)	>5,0 (440)
Темп диуреза мл день				< 500	< 300

