



Хабаровское краевое научно-практическое
общество анестезиологов и реаниматологов

Шкала седации детского госпиталя Wisconsin
The Childrens Hospital of Wisconsin Sedation Scale
(Hoffman G.M., Nowakowski R. et al., 2002)

Предназначена для оценки уровня седации у детей, основана на шкале Ramsay

Уровень сознания	Стимуляция	Баллы
Взволнован, возбуждён, беспокоен при боли	Спонтанно, без стимуляции	6
Не спит, спокоен	Спонтанно, без стимуляции	5
Дремлет с открытыми или закрытыми глазами, легко пробуждается	С мягкой или умеренной голосовой стимуляцией	4
Дремлет, возможно разбудить	Умеренная тактильная стимуляция или громкий голос	3
Может быть разбужен до сознания, но медленно	Требуется длительная болевая стимуляция	2
Может быть разбужен, но не до ясного сознания	Требуется длительная болевая стимуляция	1
Без ответа	Не отвечает на болезненные манипуляции	0

Интерпретация результатов

Баллы	Интерпретация
6	Неадекватная седация
5	Минимальная седация
4	Умеренная седация
3	Седация от умеренной до глубокой
2	Глубокая седация
1	Чрезмерная седация
0	Анестезия

