



## Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

### Факторы риска для послеродовых ВТЭО (АССР, 2012)

**Высокие факторы риска:** присутствие, по крайней мере, одного фактора риска предлагает риск послеродовых ВТЭО до 3 %

- Неподвижность (строгий постельный режим в течение 1 недели)
- Послеродовое кровотечение 1000 мл и более с хирургическим вмешательством
- Предыдущие ВТЭО
- Преэклампсия с задержкой развития плода
- Тромбофилия:
- Дефицит антитромбина
- Фактор V Лейдена (гомозиготный или гетерозиготный)
- Протромбин G20210A (гомозиготный или гетерозиготный)
- Медицинские условия
- Системная красная волчанка
- Заболевания сердца
- Серповидно-клеточная анемия
- Переливание крови
- Послеродовая инфекция

**Незначительные факторы риска:** присутствие, по крайней мере, двух факторов риска или одного фактора риска при экстренной операции кесарева сечения обуславливает риск послеродовых ВТЭО более 3%

- ИМТ 30 кг/м<sup>2</sup>
- Многоплодная беременность
- Послеродовое кровотечение более 1000 мл
- Курение более 10 сигарет в день
- Задержка развития плода
- Тромбофилия:
- Дефицит протеина С
- Дефицит протеина S
- Преэклампсия

