


Комплексный обзор

1. Четкие определения

Сепсис: определение как жизнеугрожающей острой органной дисфункции, вызванной инфекцией. Это НЕОТЛОЖНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СОСТОЯНИЕ.	
Категория	Клиническое определение
Сепсис (установленный)	Диагностически подтвержден; альтернативный диагноз маловероятен.
Сепсис (вероятный)	Высокая вероятность; это наиболее вероятный диагноз, хотя альтернативный диагноз менее вероятен.
Сепсис (возможный)	Промежуточная вероятность; также возможен альтернативный диагноз.
Сепсис (маловероятный)	Низкая вероятность или альтернативный диагноз более вероятен.
СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК: сепсис + циркуляторные нарушения (гипотензия или гиперлактатемия).	

5. Вазопрессоры

Препарат первой линии: Норадреналин
<ul style="list-style-type: none">Начать с одного препарата.Если гипотензия сохраняется → добавить вазопрессию (сниженная доза, меньше случаев фибрилляции предсердий, но возможна пальцевая ишемия).Если нестабильность сохраняется → добавить адреналин.



Целевое среднее артериальное давление (ЦАД) ≥ 65 мм рт. ст. у пациентов с септическим шоком.

2. Скрининг и биомаркеры

Рекомендуется использовать NEWS, NEWS2, MEWS или SIRS <i>NEWS2: наилучшая общая диагностическая эффективность</i>	Не рекомендуется использовать qSOFA в качестве скринингового инструмента <i>Низкая чувствительность</i>
Рекомендуется измерять лактат: полезный маркер тканевой гипоперфузии и клинической тяжести.	



Посевы крови: по возможности взять 2 набора до начала антибиотикотерапии. Не откладывайте введение антибиотиков.

3. Инфузионная терапия

Ввести 30 мл/кг в течение первых 3 часов			
Индивидуализация лечения <ul style="list-style-type: none">Непрерывная пероценка перфузии/гемодинамики и коррекция лечения на основе ответа.Мониторинг: капиллярное наполнение, диурез, психический статус, лактат.Предпочтение динамическим показателям (ППД, сердечный выброс, УО).Избегать избыточной инфузии и жесткой схемы ведения.			
Сбалансированные кристаллоидные растворы <ul style="list-style-type: none">Растворы Рингера с лактатомПредпочтительнее других растворовНизкий уровень хлоридов	0,9% раствор натрия хлорида <ul style="list-style-type: none">Гиперхлоремический ацидозРиск повреждения почек	Альбумин <ul style="list-style-type: none">Поддерживает онкотическое давлениеВысокая стоимостьИспользовать при больших объемах или циррозе	Крахмалы и желатины <ul style="list-style-type: none">Строго избегатьРиск повреждения почекРиск травмы/коагулопатии

4. Время начала антибиотикотерапии

Диагноз	Шок присутствует	Шока нет
Сепсис (установленный/вероятный)	Немедленное введение антибиотиков (в течение 1* часа)	Немедленное введение антибиотиков (в течение 1* часа)
Сепсис (возможный)	Немедленное введение антибиотиков (в течение 1 часа)	Быстрая оценка* <ul style="list-style-type: none">Инфекция vs неинфекционные причиныСрочная оценка При сохраняющихся сомнениях: антибиотики в течение < 3 часов

*Быстрая оценка для исключения неинфекционных причин перед началом антибиотиков.

6. Дополнительная поддержка

Мероприятие	Ключевые положения
Высокопоточная носовая оксигенация (HFNC)	Предпочтительнее обычной кислородотерапии при гипоксемической дыхательной недостаточности.
Механическая вентиляция (ОРДС)	ДО 6 мл/кг, плато-давление (Pplat) ≤ 30 см вод. ст., высовая ПДКВ.
Стратегия вентиляции	Избегать агрессивного поэтапного повышения параметров.
Прон-позиция	> 12 часов в сутки при умеренном и тяжелом ОРДС.
Внутривенные кортикостероиды	Показаны при септическом шоке (гидрокортизон 200 мг/сутки).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: витамин С / витамин D / внутривенный иммуноглобулин / гемоперфузия / полимиксин В.